



โรคไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ



1. ไข้สูงเฉียบพลัน
เมื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน



2. มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ



3. มีภาวะข้อขัดช่วงไขสัน
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



4. ตับโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปิด

ปิดฝาภาชนะให้สนิท

ปล่อย

ปล่อยปลากินลูกน้ำ

ปรับ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้

ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน

การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”
ห้ามใช้แอสไพริน

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
นำส่งสัยควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด
นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



ด้วยความปรารถนาดี จาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร